Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 26

27 de junio de 2022

CULTIVOS HORTICOLAS

PUERRO

La única zona con punto de seguimiento de este cultivo en la Red es en Cinco Villas, con el cultivo entre 3 y 6 hojas.

Plagas

Hasta el momento no ha habido presencia de plagas en el cultivo.

Malas hierbas

Las labores de control, principalmente manual, de las malas hierbas permiten que aunque en los controles se contabilizan ejemplares de especies como *Abutilon theophrasti* (soja borde), *C. rotundus* (juncia) y *Xanthium strumarium* (carrucheras), típicas especies de verano; y algunos *Sonchus spp.* (lechacinos), éstos no supongan un problema importante para el cultivo.

TOMATE

El tomate se encuentra en estado fenológico de primera flor abierta de la sexta inflorescencia.

Plagas

TUTA (*Tuta absoluta*)

A pesar de que en las últimas semanas las temperaturas han sido muy altas, las capturas de Tuta se siguen manteniendo en números bajos, con cifras en torno a 10 capturas por trampa y semana.

HELIOTIS (*Heliothis armigera*)

Las capturas de Heliothis siguen siendo en general más altas que las de *Tuta absoluta*. En especial destaca la cifra de 348 capturas/trampa semana en la zona de Ejea de los Caballeros, seguida de 56 capturas en Fuentes de Ebro.

Malas hierbas

Los datos de presencia de malas hierbas en las parcelas de tomate se mantienen más o menos constantes, a excepción de Ejea que tiene una mayor presencia con un porcentaje de ocupación del 28%.

PATATA

La patata está en estado fenológico de desarrollo de las partes vegetativas cosechables.

Plagas

ESCARABAJO DE LA PATATA (*Leptinotarsa decemlineata*)

Las capturas de escarabajo de la patata son muy bajas, incluso algo inferiores a las de la semana pasada, con alrededor de 1-2 adultos, 1-2 puestas, 1-2% de plantas ocupadas y 1-2 larvas.

GUSANO DEL ALAMBRE (*Agriotes spp.*)

El gusano de alambre, sigue siendo la principal plaga de patata en cuanto a capturas en las parcelas de seguimiento, pero con menor presencia que las semanas anteriores. Se ha apreciado un descenso notable en la población, pasando de 91 capturas a 39 en una zona de monitoreo, y de 9 capturas a únicamente 2 en otra zona.

Presencia de *Leptinotarsa decemlineata* en patata en Teruel